

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата
для медицинского применения
ДОБРОКАМ

Регистрационный номер: ЛП 000141

Торговое название: ДОБРОКАМ

Группировочное название: бромкамфора

Лекарственная форма: таблетки

Состав: 1 таблетка содержит:

активное вещество: бромкамфора – 250 мг;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный – 41 мг, тальк – 9 мг.

Описание: таблетки белого или серовато-белого цвета с вкраплениями кристаллов бромкамфоры, плоскоцилиндрические с риской и фаской, с характерным запахом камфоры.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство.

Код АТХ: [N05CM]

Фармакологические действие

Седативное средство – препарат брома. Как и другие бромиды обладает способностью усиливать процессы торможения в коре головного мозга, особенно при повышенной возбудимости центральной нервной системы. Облегчает наступление естественного сна.

Фармакокинетика

Легко абсорбируется в желудочно-кишечном тракте. Проникает через гистогематические барьеры, включая плацентарный. Гидроксилуруется в печени до оксиметаболитов, которые в виде глюкуронидов выводятся почками.

Показания к применению

Повышенная возбудимость, астения, кардиалгия, тахикардия, лабильность артериального давления.

Противопоказания

Гиперчувствительность к камфоре, бромидам или другим компонентам препарата, печеночная и/или почечная недостаточность. Детский возраст до 7 лет.

С осторожностью

Пациентам с нарушениями функции печени, с аллергическими заболеваниями в анамнезе.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применяется по согласованию с врачом. Необходимо соотнести пользу от применения у матери и риск для плода или ребёнка.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Взрослым и детям старше 14 лет – по 1-2 таблетки 2-3 раза в день; детям в возрасте 7-10 лет – по 1 таблетке 2 раза в день; детям в возрасте 10-14 лет - по 1 таблетке 2-3 раза в день. Максимальная суточная доза: для взрослых и детей старше 14 лет – 1,5 г; для детей в возрасте 7-10 лет - 0,5 г; для детей в возрасте 10-14 лет - 0,75 г. Курс лечения - 10-15 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции, заторможенность, сонливость, диспепсические явления.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, повышение температуры, анурия, делирий, мышечное подергивание, эпилептиформные судороги, угнетение центральной нервной системы, затрудненное дыхание, характерный запах камфоры в выдыхаемом воздухе, дыхательная недостаточность, кома.

Лечение: промывание желудка, назначение внутрь солевых слабительных и активированного угля внутрь. При судорогах применяют внутривенно диазепам или быстродействующие барбитураты (тиопентал натрия). Гемодиализ с липидным диализатом.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Проконсультируйтесь с врачом, если Вы принимаете другие препараты.

Особые указания

Влияние препарата на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций:

В период лечения необходимо отказаться от управления транспортными средствами и занятиями другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки 250 мг.

По 25, 30, 50 или 100 таблеток в банки из оранжевого стекла или полимерных материалов.

1 банку по 25, 30, 50 или 100 таблеток вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

По истечении срока годности препарат не применять.

Условия отпуска из аптек.

Отпускается без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии

ОАО «Ирбитский химфармзавод»

623856, Россия, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Кирова, д. 172.

Тел/факс (34355) 3-60-90.

Адрес производства: Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Карла Маркса д.124-а;

Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Заводская, д.2.